



Ministère
de l'Agriculture
Service Régional de la
Protection des Végétaux

Allée de la Croix Rompue
518, rue St Fuscien
80092 AMIENS
CEDEX 3
Tél : 03.22.33.55.97
Fax : 03.22.33.55.56
E-mail : srpv.draf-
picardie@agriculture.gouv.fr
Notre site : www.srpv-
picardie.com

Bulletin réalisé avec la
participation de la
FREDON Picardie par
délégation (art. L252-1 à
L252-5 du Code Rural).

Imprimé à la station
d'Avertissements
Agricoles d'AMIENS
Directeur gérant :
Christophe MARTINET
Publication périodique
C.P.P.A.P n°1823AD
ISSN n°07576609

Tarif Courrier 59 •
Tarif Fax 59 •
Tarif E-mail 57 •

AVERTISSEMENTS AGRICOLES®

POUR DE BONNES PRATIQUES AGRICOLES

PICARDIE

Bulletins Techniques des Stations d'Avertissements Agricoles n° 21 du 6 septembre 2004 - 01 page

Phénologie

Stade : sénescence - récolte.

Mildiou

Situation sanitaire

En variétés tardives, les symptômes de mildiou sur feuillage ne sont plus isolés. Quelques symptômes d'*Erwinia* ont été observés.

Le coin des modèles

Selon les secteurs, les conditions climatiques (brouillards et rosées) ont engendré de nouvelles contaminations (Ebouveau, Forte, Abbeville, Marcelcave, Villers Bocage et Villiers le Sec).

D'après MILSOL, les potentiels de sporulation restent forts sur tous les postes.

Préconisations

Malgré le peu de contaminations enregistrées la semaine dernière sur l'ensemble de la

région, le risque de sporulation est toujours important. De plus, les symptômes de mildiou sont bien présents en parcelle.

Il est donc impératif (même si les travaux agricoles sont nombreux par ailleurs) de poursuivre la protection de vos parcelles. Il serait dommage de mettre en péril la qualité d'une récolte en négligeant la protection fongicide de cette fin de campagne.

➤ Sur les parcelles où le défanage est proche
En raison des conditions climatiques actuelles, nous conseillons, d'utiliser un produit ayant une action renforcée sur la protection du tubercule (matière active de type cyazofamide, fluazinam, zoxamide...).

➤ Sur les parcelles en cours de défanage
Maintenir la protection fongicide jusqu'à dessiccation complète de la végétation. Utilisez un dithiocarbamate en l'absence de mildiou, dans le cas contraire employez une des matières actives citées ci-dessus.

➤ Sur les parcelles maintenues en végétation
Poursuivez votre protection avec un contact à base de dithiocarbamate.

Situation épidémiologique poste par poste du 6 septembre

Postes climatiques	Génération	Date de dernières contaminations (depuis le précédent bulletin)	Date prévue de sortie de tache	Potentiel de sporulation
Amiens	12 ème	aucune	aucune	fort
Attilly	13 ème	aucune	le 6/09	fort
Ebouveau	16 ème	du 3 au 5/09	à partir du 6/09	fort
Forte	14 ème	le 3/09	à partir du 6/09	fort
Abbeville (Inval)	16 ème	du 3 au 5/09	à partir du 6/09	fort
Marcelcave	14 ème	le 4/09	à partir du 6/09	fort
Saint Just en Chaussée	13 ème	aucune	le 6/09	fort
Vauvillers	12 ème	aucune	le 6/09	fort
Verdilly	13 ème	aucune	à partir du 6/09	fort
Vic sur Aisne	11 ème	aucune	à partir du 6/09	fort
Villerooy	13 ème	aucune	le 6/09	fort
Villers Bocage	15 ème	le 4 et 5/09	à partir du 6/09	fort
Villiers le Sec	12 ème	le 3/09	le 10/09	fort

Mildiou:

Symptômes
observés en
parcelle :
Poursuivez la
protection

DB 4° 2000-2022

BnF
S&T

7107